

Cactus de Noël – Cactus d'automne – Cactus de Pâques

Description



Le nom **Schlumbergera** a été donné par le botaniste Charles Lemaire en hommage au collectionneur français **Frédéric Schlumberger**, un industriel du textile de Rouen (1853-1893) collectionneur passionné de cactus.

Le vrai « Cactus de Noël » est **Schlumbergera x buckleyi**, créé en 1850 par William Buckley en Angleterre, est un **croisement** de 2 cactus épiphytes **Schlumbergera truncata** (à tiges blanches) et **Schlumbergera russelliana** (à tiges roses) qui se développe dans les creux des branches en forêt d'Amérique du Sud.

Segments de Schlumbergera truncata : segments foliaires très dentelés avec deux pointes à l'extrémité qui ressemblent à de petites cornes



Segments de Schlumbergera russelliana : segments aplatis, pas de dents mais des cœcs arrondis.



Segments de Schlumbergera x buckleyi : segments plats, Ã peine crÃ©nelÃ©s

Schlumbergera x buckleyi a un port pleureur, ses tiges plutÃ´t dressÃ©es ne retombent qu'avec les annÃ©es. Les segments des tiges sont rectangulaires avec des bords crÃ©nelÃ©s et ses **fleurs retombantes sont toujours de couleur fuchsia**! **Ã NoÃ«l!**

Ce cactus est rarement vendu en pÃ©piniÃ¨re, mais on le trouve parfois dans les maisons privÃ©es, passÃ© d'un jardinier Ã un autre au cours des gÃ©nÃ©rations.

Le cactus de NoÃ«l fleurit au mois de mai dans son **pays d'origine, le BrÃ©sil**, oÃ¹ on l'appelle couramment flor de maio (fleur de mai)!

Chez nous, **le schlumbergera fleurit** durant le mois de **dÃ©cembre, produit des fleurs aux couleurs multiples : rouge, rose, blanche ou encore violette**, Les fleurs se dÃ©veloppent sur les feuilles de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Elles ne tiennent en moyenne que 5 Ã 7 jours

Ã planter dans un **mÃ©lange de sable et de terre** enrichi avec de **l'engrais diluÃ© dans l'eau destinÃ© aux cactÃ©s**.

Dans son pot, ses racines aiment Ãªtre Ã l'Ã©troit. Disposez des galets ou des **billes d'argile dans le fond du pot**.

La plante doit Ãªtre **Ã l'abri des courants d'air et des rayons directs du soleil**. Placez-la dans une piÃ©ce lumineuse sans soleil direct et loin des sources de chaleur (comme le **radiateur**). Une fois le lieu dÃ©terminÃ©, il ne faudra plus bouger la plante sous peine de faire tomber les fleurs ou les bourgeons.

La **tempÃ©rature ambiante** doit Ãªtre comprise **entre 10 et 15°C**.

Arrosez-la rÃ©guliÃ¨rement avec de l'eau de pluie tout en laissant le sol sÃ©cher entre deux arrosages. Pensez Ã vider l'eau de la soucoupe pour Ã©viter tout pourrissement des racines.

RÃ©alisez un **rempotage tous les 3 ou 4 ans** dans un pot plus grand durant les mois de fÃ©vrier, mars ou avril.

Les **cochenilles farineuses** sont des petits parasites trÃ¨s redoutÃ©s par le cactus de NoÃ«l. Diluez du savon noir liquide dans de l'eau. Puis, Ã l'aide d'un spray, pulvÃ©risez la solution sur toute la plante. Comptez environ 10% de savon noir dans votre solution. RÃ©pÃ©tez ensuite l'opÃ©ration jusqu'Ã vous dÃ©barrasser dÃ©finitivement des cochenilles farineuses.

Si les feuilles de votre cactus de NoÃ«l se ramollissent, c'est peut-Ãªtre dÃ» Ã un manque d'eau

Les feuilles rouges sont le signe que votre cactus de NoÃ«l est trop exposÃ© au soleil.

Pour fleurir, le schlumbergera a besoin d'intervalles entre lumiÃ¨re et obscuritÃ©.

Le **cactus de Noël** produit des fleurs tubulaires, longues de 7,5 cm. Sépales et pétales sont soudés puis s'ouvrent en de multiples extensions qui s'ouvrent en deux cercles, mais irrégulièrement recourbés, ce qui donne une forme asymétrique à la fleur. Les étamines sont aussi soudées en tube, nombreuses et émergeant de la corolle.

Un mois après la fin de la floraison, supprimez un ou deux segments de tige sur chacune d'entre elles, afin qu'elles en refassent de nouvelles. La croissance des branches se fait d'avril à septembre.

Cessez les arrosages pendant un mois et demi environ afin d'accorder un **temps de repos à la plante**. Reprenez les arrosages lorsque de nouvelles tiges se seront formées. La croissance des branches se fait d'avril à septembre.

En été (de juillet à septembre), *Schlumbergera x buckleya* sera aussi bien dehors, à l'ombre d'un arbre et **hors de la portée des limaces**.

En été, sectionnez des fragments avec 3 segments minimum, les laisser sécher quelques heures et les repoter dans le même mélange que la plante mère.

De nombreux cultivars de cactus de Noël existent maintenant, présentant une large palette de couleurs, y compris le blanc et le jaune.

Mes cactus

Celui-ci en fleurs actuellement (décembre 2021)



Celui-ci a fleuri en octobre â€“ novembre 2021 = cactus dâ€™automne



Et puis, il y a encore celui-ci qui fleurit Ã diffÃ©rents moments de lâ€™annÃ©e et qui fleurit maintenant (dÃ©cembre 2021)





Rhipsalidopsis gaertneri / Hatiora gaertneri est communément appelé « cactus de Pâques », « cactus de Pentecôte ».

Les **cactus de Pâques**, espèces et hybrides du genre *Hatiora*, sont d'autres cactus épiphytes ayant les mêmes exigences de culture que le cactus de Noël. Ils **fleurissent au printemps** dans des tons de rose, orange ou violet. Les garder au frais (15 °C) en hiver pour stimuler leur floraison.

Le cactus de Pâques ne tolère pas les rayons directs du soleil.

La **température** ne doit **jamais descendre en-dessous de 10°C** pour cette plante tropicale, et en-dessous de 16°C, mieux vaut espacer les apports d'eau et n'arroser que pour empêcher le flétrissement de la plante.

Ses tiges ont une forme plus arrondies. Ses fleurs ont la forme d'une étoile, et apparaissent à l'extrémité des tiges entre les mois d'avril et de juillet. Le pistil des fleurs est très court.

Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. cactus
2. Noël
3. Pâques

date création
14 décembre 2021

Auteur
cblanke