

Peut-on cultiver le melon avec succÃ¨s ?

Description

default watermark

Botanique



VariÃ©tÃ©s de melon (source : Wikipedia)

Originaire dâ??Asie Mineure, le melon (*Cucumis melo*) est une plante annuelle appartenant Ã la famille des CucurbitacÃ©es dont les tiges sont munies de vrilles pour sâ??accrocher aisÃ©ment Ã un support. Le type sauvage nâ??est pas connu.

Il a Ã©tÃ© introduit en Italie par les papes et, en France vers la fin du 15Ã¨me siÃ¨cle au retour de lâ??expÃ©dition de Charles VIII.

Les melons sont classÃ©s en trois groupes :

- les melons brodÃ©s (brodÃ© succinct de Tours) Ã peau rÃ©ticulÃ©e qui ne se conservent pas ;

- les melons cantaloups (Charentais, de Bellegarde) Ã peau lisse qui se conservent plusieurs jours ;
- les melons dâ??hiver ou de garde (Blanc dâ??Antibes) Ã peau lisse, Ã chaire orangÃ©e ou verdÃ¢tre qui se conservent longtemps.

Choisir un milieu adÃ©quat

GrÃ¢ce Ã la sÃ©lection de variÃ©tÃ©s prÃ©coces, le melon peut actuellement Ãªtre cultivÃ© dans nos potagers mais il faudra nÃ©anmoins respecter certaines rÃ¨gles Ã appliquer Ã ces lÃ©gumes des rÃ©gions ensoleillÃ©es.
Cette plante grimpante doit Ãªtre fixÃ©e sur un support : faÃ§ade ensoleillÃ©e, ficelles tendues, bÃ¢tons de bois Ã Ã©corce rugueuse.

Il faudra lui rÃ©server lâ??endroit le plus chaud du jardin, lâ??emplacement idÃ©al Ã©tant une serre ou un tunnel.
Il peut Ãªtre cultivÃ© comme plante rampante sur le sol qui sera alors recouvert dâ??un plastique noir.
Le sol doit Ãªtre copieusement enrichi Ã lâ??aide de fumier dÃ©composÃ© ou de compost.

default watermark

Technique culturale adaptÃ©e



Petit gris de Rennes

Les semis se feront en pots de 10 cm de diamÃ¨tre Ã raison de deux graines par pot de mi-avril Ã mai.
La tempÃ©rature ne doit pas descendre en dessous de 22Â° C pendant la germination. Nous vous conseillons dâ??arroser avec de lâ??eau Ã cette tempÃ©rature.

Fin mai, on choisira les plantes les plus robustes qui seront plantÃ©es dans une terre enrichie. On rÃ©servera une surface de 1 m2 par plante, espacement entre les plants de 75 cm.

Le melon Ã©met des tiges qui bifurquent ? Les deux premiÃ¨res ramifications donnent des fleurs mÃ¢les, la troisiÃ¨me des fleurs femelles. La taille est indispensable pour hÃ¢ter les bifurcations et

produire rapidement des fleurs femelles donnant des fruits.

En gÃ©nÃ©ral, il est recommandÃ© de sectionner la pousse principale au-dessus de la troisiÃ¨me ou quatriÃ¨me feuille Ã©tant donnÃ© que les fruits se dÃ©veloppent de prÃ©fÃ©rence sur les tiges secondaires.

On Ã©vitera dâ??arroser le bas des tiges, car elles sont sensibles au pourrissement.
On doit Ã©galement raccourcir les pousses secondaires Ã©mises par la plante sur 3 Ã 4 feuilles. Chaque branche secondaire produira Ã son tour 3 Ã 4 petites tiges. On les raccourcira dÃ¨s quâ??elles auront 5 feuilles. Ces branches porteront des fleurs mÃ¢les et femelles et ces derniÃ¨res produiront des fruits.
Laissez mÃ»rir un maximum de cinq fruits par plant en Ã©liminant rapidement les fruits excÃ©dentaires (pincer les tiges deux feuilles au-dessus des melons).

La rÃ©colte a gÃ©nÃ©ralement lieu dÃ©but aoÃ»t ; les fruits doivent dÃ©gager une bonne odeur et des fissures apparaissent au sommet des tiges.

default watermark

Maladies et ravageurs

Elles sont sensibles aux maladies frÃ©quentes chez les espÃ¨ces de la famille des CucurbitacÃ©es. Les pucerons sont frÃ©quents et seront combattus Ã lâ??aide dâ??un insecticide Ã base de pyrÃ¨thre. Il faut aussi craindre la mouche noire du cornichon et les acariens (araignÃ©es rouges). Lors dâ??une forte humiditÃ© et dâ??importantes fluctuations de tempÃ©rature, des attaques dâ??oÃ¯dium sont Ã craindre ; un fongicide du commerce fera lâ??affaire.

En serre, les jeunes plants peuvent souffrir dâ??anthracnose (taches brunÃ¢tres) ; il faudra assurer une bonne aÃ©ration et une tempÃ©rature convenable afin de prÃ©venir cette maladie.
La bactÃ©riose se dÃ©veloppe dans un sol infectÃ© lors dâ??une tempÃ©rature supÃ©rieure Ã 20Â° C. Pour prÃ©venir cette infection qui se dÃ©veloppe rapidement, il faut attendre trois ans avant de planter des melons au mÃªme endroit. On dÃ©truira les parties atteintes et on pulvÃ©risera plusieurs fois Ã lâ??aide dâ??un fongicide Ã base de cuivre.

Les variÃ©tÃ©s

On peut citer quelques variÃ©tÃ©s rÃ©putÃ©es :

- Melon jaune canari : fruit lisse de couleur jaune or ;
- Ogen : melon vigoureux aux grands fruits verts ;
- Jet, hybride F1 : melon charentais sucrÃ©, conservation aprÃ¨s rÃ©colte ;
- Jerac, hybride F1 : prÃ©coce, gros fruits parfumÃ©s ;
- Petit gris de Rennes : adaptÃ© au climat frais, chair orangÃ©e succulente.

On peut signaler en passant le melon cornu (*Cucumis meduliferus*) originaire des steppes de lâ??Afrique du Sud et connu sous le nom de kiwano. Ce fruit ornÃ© de nombreuses Ã©pines cornÃ©es est stockÃ© pendant plusieurs semaines pour sa maturation et se conserve plusieurs mois. Sa chair vert foncÃ©, gÃ©latineuse est dÃ©licieuse ; son arÃ´me rappelle celui de la banane.

- 
- 

Melon cornu (kiwano)

Categorie

1. SRHGx
2. to check

Tags

1. culture
2. lÃ©gume
3. melon

date crÃ©Ã©e
6 fÃ©vrier 2021
Auteur
srhgx